

Il Sottosegretario di Stato
con delega allo Sport
Crimi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Allegato A)

| LESIONI APPARATO SCHELETRICO CRANIO | |
|---|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 7,00% |
| FRATTURA SFENOIDE | 5,00% |
| FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 3,00% |
| FRATTURA LEFORT I° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) | 4,00% |
| FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°) | 7,00% |
| FRATTURA ETMOIDE | 3,00% |
| FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile) | 2,00% |
| FRATTURA OSSA NASALI | 2,50% |
| FRATTURA MANDIBOLARE (PER LATO) | 4,00% |
| LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA | 5,00% |
| TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | 8,00% |

| COLONNA VERTEBRALE TRATTO CERVICALE | |
|--|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 6,00% |
| FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% |
| FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA | 8,00% |
| FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I-VERTEBRA | 10,00% |

| TRATTO DORSALE | |
|--|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA DEL CORPO DALLA I° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 4,00% |
| FRATTURA DEL CORPO XII° VERTEBRA | 8,00% |
| FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSALI DALLA I° ALLA XII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% |

| TRATTO LOMBARE | |
|--|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) | 8,00% |
| FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSALI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% |

| OSSO SACRO | |
|---|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI | 4,00% |

| COCCIGI | |
|--|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE | 4,00% |

| BACINO | |
|--|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE | 3,00% |
| FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO) | 6,00% |

| TORACE | |
|-----------------------------------|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO) | 4,00% |
| FRATTURA STERNO | 2,00% |
| FRATTURA DI UNA COSTA (COMPOSTA) | 0,50% |
| FRATTURA DI UNA COSTA (SCOMPOSTA) | 1,50% |
| FRATTURA SCAPOLA (PER LATO) | 3,00% |
| PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA | 6,00% |
| PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA | 10,00% |

| ARTO SUPERIORE (DX o Sn) BRACCIO | |
|---|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA DIAFISARIA OMERALE | 3,00% |
| FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) | 6,00% |
| FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) | 6,00% |

| AVAMBRACCIO | |
|---|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA DIAFISARIA RADIALE | 2,00% |
| FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) | 4,00% |
| FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) | 4,00% |
| FRATTURA DIAFISARIA ULNARE | 2,00% |
| FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) | 4,00% |
| FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO) | 4,00% |
| FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA | 4,00% |
| FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | 5,00% |

| POLSO E MANO | |
|-----------------------------|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA SCAFOIDE | 5,00% |
| FRATTURA SEMILUNARE | 3,00% |
| FRATTURA PIRAMIDALE | 2,00% |
| FRATTURA PISIFORME | 1,00% |

| | |
|--|-------|
| FRATTURA TRAPEZIO | 2,00% |
| FRATTURA TRAPEZOIDE | 2,00% |
| FRATTURA CAPITATO | 2,00% |
| FRATTURA UNCINATO | 2,00% |
| FRATTURA I° METACARPALE | 6,00% |
| FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE | 3,00% |
| SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) | 4,00% |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| FRATTURA PRIMA FALANGE DITA | |
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| POLLICE | 4,00% |
| INDICE | 3,00% |
| MEDIO | 3,00% |
| ANULARE | 2,00% |
| MIGNOLO | 3,00% |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| FRATTURA SECONDA FALANGE DITA | |
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| POLLICE | 3,00% |
| INDICE | 2,50% |
| MEDIO | 2,00% |
| ANULARE | 1,00% |
| MIGNOLO | 2,00% |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| FRATTURA TERZA FALANGE DITA | |
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| INDICE | 2,00% |
| MEDIO | 1,00% |
| ANULARE | 1,00% |
| MIGNOLO | 2,00% |

| | |
|--|--------------|
| ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA FEMORE | |
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| DIAFISARIA | 6,00% |
| EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico) | 10,00% |
| EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) | 10,00% |
| FRATTURA ROTULA | 4,00% |

| | |
|--|--------------|
| ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA TIBIA | |
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| DIAFISARIA | 3,00% |
| ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) | 5,00% |
| ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) | 5,00% |

| | |
|---|--------------|
| ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA PERONE | |
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| DIAFISARIA | 2,00% |
| ESTREMITA' SUPERIORE (capitello o faccetta articolare tibiale) | 3,00% |
| ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | 4,00% |

| | |
|---|-------|
| FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA | 5,00% |
| FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA | 6,00% |

| PIEDE - TARSO | |
|-----------------------------|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA ASTRAGALO | 6,00% |
| FRATTURA CALCAGNO | 7,00% |
| FRATTURA SCAFOIDE | 3,00% |
| FRATTURA CUSOIDE | 4,00% |
| FRATTURA CUNEIFORME | 1,00% |

| PIEDE - METATARSI | |
|--|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA I° METATARSALE | 4,00% |
| FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE | 2,00% |

| PIEDE - FALANGI | |
|---|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange) | 2,50% |
| FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% |

| LESIONI DENTARIE | |
|--|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente) | 0,70% |
| ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente) | 0,20% |
| ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente) | 0,50% |
| ROTTURA CANINI (per ogni dente) | 1,00% |
| ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,50% |
| ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,75% |
| ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente) | 1,50% |
| ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente) | 1,00% |
| ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE | 0,25% |
| ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE | 0,50% |

| LESIONI PARTICOLARI | |
|--|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) | 8,00% |
| ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | 10,00% |
| ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA | 15,00% |
| ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) | 10,00% |
| GASRTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE | 40,00% |
| RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile- | 20,00% |
| RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) -non cumulabile- | 40,00% |
| RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO -non cumulabile- | 15,00% |
| COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile- | 40,00% |

| | |
|---|---------|
| AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile- | 60,00% |
| COLECISTECTOMIA -non cumulabile- | 5,00% |
| SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA | 4,00% |
| SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile) | 6,00% |
| EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | 10,00% |
| PORTATORE ASINTOMATICO ANTICORPO POSMVO (HIV+) | 4,00% |
| PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE - non cumulabile- | 50,00% |
| ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente) | 3,00% |
| ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente) | 5,00% |
| LOBECTOMIA POLMONARE | 15,00% |
| PNEUMONECTOMIA | 30,00% |
| PROTESI SU AORTA TORACICA | 20,00% |
| PROTESI SU AORTA ADDOMINALE | 15,00% |
| PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE | 35,00% |
| CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | 25,00% |
| PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI | 100,00% |
| SORDITA' COMPLETA UNILATERALE | 12,00% |
| SORDITA' COMPLETA BILATERALE | 50,00% |
| PERDITA NASO (oltre i due terzi) | 30,00% |
| CORDECTOMIA | 15,00% |
| EMILARINGECTOMIA | 25,00% |
| LARINGECTOMIA | 50,00% |
| PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | 70,00% |
| PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | 8,00% |
| PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI | 15,00% |
| ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-) | 8,00% |
| ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente) | 4,00% |
| PROTESI D'ANCA (non cumulabile) | 20,00% |
| PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) | 25,00% |
| PATELLECTOMIA TOTALE | 10,00% |
| PATELLECTOMIA PARZIALE | 4,00% |
| PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO | 5,00% |
| PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI | 25,00% |
| PERDITA ANATOMICA DEL PENE | 30,00% |
| ISTERECTOMIA (non cumulabile) | 20,00% |
| ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE | 30,00% |
| OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE | 5,00% |
| USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (documentate fotograficamente) | 30,00% |
| PTOSI PALPEBRALE | 5,00% |
| EVIRAZIONE COMPLETA | 45,00% |
| PERDITA DEL PENE | 35,00% |
| IMPOSSIBILITA' ALL'EREZIONE | 25,00% |
| CASTRAZIONE | 25,00% |

| LESIONI MUSCOLO-TENDINEE | |
|---|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | 9,00% |
| ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 5,00% |
| ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 7,00% |
| ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) - valore massimo per ogni dito | 3,00% |
| ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | 6,00% |
| LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) | 4,00% |
| LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) | 7,00% |
| LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) | 5,00% |
| LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 3,00% |
| LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 4,00% |
| LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) | 6,00% |
| LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | 5,00% |
| LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente) - valore massimo per ogni dito- | 2,50% |
| LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente) | 4,00% |
| LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) | 10,00% |
| LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) | 2,00% |
| LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente) | 1,00% |
| LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente) | 5,00% |
| LESIONE DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro- | 8,00% |
| LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 2,50% |
| LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) | 2,50% |
| LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONE-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 6,00% |
| LUSSAZIONE ULNO CARPICA | 3,00% |
| LUSSAZIONE ROTULA | 3,00% |
| LUSSAZIONE TIBIO TARSICA | 6,00% |
| LUSSAZIONE VERTEBRALE | 5,00% |

| AMPUTAZIONI - ARTO SUPERIORE | |
|--|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE | 80,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO | 70,00% |
| AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 65,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE | 52,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 58,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO | 56,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 50,00% |

| | |
|---|--------|
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 44,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO | 45,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE | 42,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO | 47,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE | 38,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO | 43,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO | 40,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE | 32,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 37,00% |
| AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 30,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE | 35,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO | 35,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE | 28,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO | 33,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO | 24,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE | 22,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO | 27,00% |
| AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE | 18,00% |
| AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO | 23,00% |
| AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO | 20,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE | 20,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE | 14,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO | 10,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE | 7,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO | 12,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | 13,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE | 5,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO | 3,50% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE | 2,50% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO | 4,50% |
| AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE | 10,00% |
| AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO | 8,00% |
| AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE | 6,00% |
| AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO | 9,00% |

| AMPUTAZIONI - ARTO INFERIORE | |
|---|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia) | 70,00% |
| AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio) | 65,00% |
| AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio) | 65,00% |
| AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE | 50,00% |
| PERDITA DI UN PIEDE | 45,00% |
| PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE | 27,00% |
| PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI | 100,00% |
| PERDITA DELL'ALLUCE | 6,00% |
| PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE | 3,00% |
| PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% |

| LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti-Stabilizzati) | |
|---|--------------|
| ARTO SUPERIORE | |
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE | 60,00% |
| SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5-D1 | 45,00% |
| SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE | 45,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE | 18,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE | 35,00% |
| PARALISI BASSA NERVO RADIALE | 25,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO | 40,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO ULNA | 25,00% |
| PARALISI BASSA NERVO ULNARE | 20,00% |

| LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti-Stabilizzati) | |
|---|--------------|
| ARTO INFERIORE | |
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBAR D12-L4 | 35,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE | 30,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO | 45,00% |
| PARALISI BASSA NERVO SCIATICO | 38,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO | 20,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO | 22,00% |

| LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE | |
|---|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE | 15,00% |
| EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI | 30,00% |
| PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITA' DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO | 40,00% |
| MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITA' AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO | 40,00% |
| MONOPARESI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO | 35,00% |

| USTIONI - CAPO | |
|---|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 3,00% |
| USTIONE 2° O 3° GRADO DELL'11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 10,00% |
| USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 14,00% |
| USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 18,00% |
| USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO | 5,00% |
| USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO | 10,00% |

| USTIONI - ARTI SUPERIORI E INFERIORI | |
|--|--------------|
| TIPOLOGIA DI LESIONE | PERC. |
| USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 5,00% |
| USTIONE 2° O 3° GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 10,00% |
| USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 15,00% |
| USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 20,00% |